



Allegato alla Delib.G.R. n. 13/24 del 17.3.2020

Indirizzi per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 del Decreto Legge 9.3.2020, n. 14 al personale del Servizio Sanitario Regionale.

Ai sensi dell'articolo 7 del DL 14/2020, al fine di garantire il mantenimento dei servizi essenziali di cura e di assistenza della popolazione, gli operatori del SSR che abbiano avuto un contatto stretto a rischio con un caso confermato di COVID-19, sia nel contesto lavorativo sia in quello extra lavorativo:

- **se asintomatici continuano l'attività lavorativa con le precauzioni raccomandate¹.** Pertanto, gli operatori sanitari asintomatici che siano stati posti in isolamento per contatto stretto a rischio e sottoposti a sorveglianza attiva **possono essere richiamati in servizio qualora siano indispensabili per garantire le attività assistenziali.**
- **Interrompono il servizio solo qualora si manifestino i sintomi o risultino positivi al tampone per COVID-19.**

Si precisa che

- l'operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19 **NON è da considerarsi "CONTATTO"** quando l'attività assistenziale viene condotta con l'utilizzo completo e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ambito di applicazione e procedure

L'articolo 7 del DL 14/2020 si applica a tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale indipendentemente dall'inquadramento contrattuale, quindi:

- al personale dipendente di tutti e quattro i ruoli (sanitario, professionale, tecnico e amministrativo);
- al personale convenzionato e collaboratori, compresi i medici dell'emergenza territoriale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali.

Se l'operatore ha svolto l'attività di assistenza senza gli adeguati DPI per rischio droplet e da contatto, o il contatto con caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 è avvenuto in ambito extra ospedaliero, deve segnalare tempestivamente tale evenienza.

È compito della direzione di Presidio Ospedaliero (per il personale dell'ambito ospedaliero) e della SC Igiene e sanità pubblica (per il personale extra-ospedaliero) verificare quali operatori del SSR siano venuti a contatto stretto a rischio con un caso confermato di COVID-19, in ambito lavorativo o extra-lavorativo.

L'elenco di questi operatori dovrà essere trasmesso al medico competente per il personale dipendente, e alla SC di Igiene e sanità pubblica per il personale convenzionato e collaboratori, che provvederanno a contattare gli interessati per una prima valutazione anamnestica.

Si dispone che la valutazione circa l'effettuazione del tampone sia svolta dall'UCL.

¹ Vedasi indicazioni per Indicazioni per l'utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) del presente documento



La tabella seguente sintetizza le misure da adottare a seguito dell'accertamento anamnestico e diagnostico

Esito accertamento anamnestico	Esito del tampone	Misure da adottare
Operatore sintomatico	Positivo	L'operatore è posto in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni dall'esposizione.
	Negativo	L'operatore è posto in isolamento fiduciario per 14 giorni dall'esposizione, in auto-sorveglianza per il ruolo sanitario e in sorveglianza attiva per tutti gli altri. Rivalutazione con tampone alla risoluzione dei sintomi
Operatore asintomatico	Positivo	L'operatore è posto in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni dall'esposizione
	Negativo	Ammissione al lavoro con utilizzo di DPI e mascherina chirurgica. Automonitoraggio delle condizioni cliniche e ripetizione del tampone ogni 48 ore fino al 14° giorno dal contatto stretto con il caso. Se insorgono i sintomi o il tampone è positivo, l'operatore è sospeso dall'attività lavorativa ed è posto in quarantena per 14 giorni in sorveglianza attiva

In assenza di sintomi e laddove disposta l'esecuzione del tampone non è prevista l'interruzione dal lavoro purché vengano utilizzati i DPI e la mascherina chirurgica.

Per definire guariti gli operatori sanitari risultati positivi al tampone, al termine del periodo di isolamento domiciliare fiduciario è necessario acquisire la negatività di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore.

Sono di seguito riportate le indicazioni per l'utilizzo delle protezioni per infezione da SARS- CoV2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie.



Allegato 1. Indicazioni per un utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19)

E' documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19 o coloro che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19.

Tabella tratta da "Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID-19" – World Health Organization, 27 February 2020.

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori /pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
--------------------	--	----------	---

Attività di degenza			
Stanza di pazienti COVID-19	Operatori sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso• Guanti• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• FFP2/FFP3• Camice monouso• Guanti• Occhiali/occhiali a maschera• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Addetti alle pulizie	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti spessi• Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)• Stivali o scarpe da lavoro chiuse
	Visitatori	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19, qualora permesso	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti



Altre aree di transito dei pazienti (ad esempio reparti, corridoi)	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	Nessuna attività che comporti contatto con pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Non sono necessari DPI
Triage	Operatori sanitari	Screening preliminare che non comporta contatto diretto	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro• Non sono necessari DPI
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro• Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Non sono necessari DPI
Laboratorio	Tecnici di laboratorio	Manipolazione di campioni respiratori	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti• Occhiali/occhiali a maschera Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera (se rischio di schizzi)



Ambulatori intra-ospedalieri e del territorio			
Ambulatori	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti• Occhiali/occhiali a maschera• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none">• I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica se tollerata
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Non sono necessari DPI
	Addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti spessi• Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)• Stivali o scarpe da lavoro chiuse



Sale d'attesa	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica se tollerata• Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri; se tale soluzione non è adattabile assicurare la distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Non sono necessari DPI



Triage	Operatori sanitari	Screening preliminare che non comporta contatto diretto	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro• Non sono necessari DPI
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro• Mascherina chirurgica se tollerata
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Non sono necessari DPI
	Accompagnatori	Accesso in stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica
Assistenza al domicilio	Paziente con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro• Mascherina chirurgica se tollerata
	Caregiver	Accesso in stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica
	Caregiver	Assistenza diretta al paziente o contatto con urine, feci o rifiuti di un paziente COVID-19 assistito a domicilio	<ul style="list-style-type: none">• Guanti• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente (se rischio di schizzi)
	Operatori sanitari	Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera



Ambulanza o mezzi di trasporto			
Ambulanza o mezzi di trasporto	Operatori sanitari	Trasporto sospetto caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Addetti alla guida	Solo guida del mezzo con sospetto caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente	<ul style="list-style-type: none">• Mantenere la distanza di almeno 1 metro• Non sono necessari DPI
		Assistenza nelle fasi di carico e scarico del paziente sospetto per COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		Nessun contatto diretto con paziente sospetto COVID-19 ma senza separazione del posto di guida da quello del paziente	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica
	Paziente con sospetta infezione da COVID-19	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica se tollerata



	Addetti alle pulizie	Pulizie dopo e durante trasporto dei pazienti con sospetta infezione da COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina chirurgica• Camice monouso idrorepellente• Guanti spessi• Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)• Stivali o scarpe da lavoro chiuse
--	----------------------	--	---